

名称	コミナティ	スパイクバックス	ダイチロナ	コスタイベ	ヌバキノビッド
(製薬会社)	(ファイザー社)	(モデルナ・ジャパン社)	(第一三共社)	(Meiji Seikaファルマ社)	(武田薬品工業社)
ワクチンの種類	mRNA	mRNA	mRNA	mRNA	組み換えタンパク
発現割合	症 状				
50パーセント以上	接種部位の痛み、疲労、頭痛	接種部位の痛み、疲労、頭痛	接種部位の痛み、倦怠感	接種部位の痛み	接種部位の痛み、疲労、頭痛、筋肉痛
10から50パーセント	筋肉痛、悪寒、関節痛、発熱、下痢、接種部位の腫れ	筋肉痛、悪寒、関節痛、吐き気・嘔吐、リンパ節の腫れや痛み、発熱、接種部位の腫れ、発赤・紅斑	接種部位の熱感・腫れ・紅斑・かゆみ・しこり、頭痛、発熱、筋肉痛	倦怠感、頭痛、悪寒、筋肉痛、関節痛、発熱、めまい、接種部位の腫れ・しこり・紅斑	倦怠感、関節痛、吐き気・嘔吐
1から10パーセント	発赤・紅斑、リンパ節の腫れや痛み、嘔吐、疼痛	接種後7日以降の接種部位の痛みなど(注記)	接種後7日以降の接種部位の痛みなど(注記)、リンパ節の腫れや痛み、発疹、脇の痛み	接種部位のかゆみ、下痢、吐き気、嘔吐	接種部位の腫れ・しこり・発赤・紅斑、発熱、四肢痛

コミナティ添付文書、スパイクバックス添付文書、ヌバキノビッド添付文書、ダイチロナ添付文書、コスタイベ添付文書より (注記) 接種部位の痛みや腫れ、紅斑など