

オオキンケイギクの見分け方

どこに生えているの？

道ばたやのり面、河川敷、空き地など、日当たりの良いところに群落をつくります。

花

小花が集まった頭状花で、直径は5～7cm。花びら(舌状花)はオレンジ色で、先は不規則に分かれます。八重咲きの品種もあります。



中心部の小花(筒状花)



種子(完熟前)



種子(果実)

扁平で翼があります。ひとつの頭状花からたくさんの種子ができて、飛び散ります。

開花期 5～7月

暖かい地域では、5月初旬に咲きはじめます。

結実期 6～9月

群落が満開の頃には、すでにたくさんの種子ができています。

茎葉


葉の柄は短く、多くの場合、対になっています(対生)。



30～70 cm

根生葉(根元の葉)

生えはじめは細長いへら状で、成長が進むにつれて3～5枚の小葉に分かれます。花時には枯れていることもあります。



ルールを守って、みんなで駆除活動を

その場で枯らせる場合

1 根から引き抜く

根元から株ごと引き抜きましょう。多年草なので、根が残るとまた生えてきます。

2 袋に入れて枯らせる

種子や根を落とさないように袋を密閉して、枯らしてください。

3 燃えるごみとして出す

自治体のごみ処理方法にしたがって処理してください。

生きたまま運ぶ場合

1 計画

地域住民や自治会、ボランティア団体等による小規模な駆除は、次の方法で法律に違反することなく行えます。

2 事前公表

ホームページやSNS公開イベントページ、広報誌やチラシ、新聞などメディアを使用する

地域の回覧板や掲示板にチラシや文書を挟む

3 駆除→処分

広報車や立て看板によるアナウンス(看板設置は地権者の方の許可を得て行ってください)

処分するために生きたまま運んだり一時保管したりすることは構いませんが、こぼれ落ちないように対策し、ごみの焼却場や燃えるごみの収集場に持ち込みましょう。

駆除するときに気をつけること

種子を落とさない

種子は土中で何年も生き残る地面に落とさないようにしましょう。種子をつける前の花の咲き始めまでに駆除するのが一番良いです。

継続的に駆除する

根絶には時間がかかります駆除した後も根や種子が残っているので、翌年も生えてきます。毎年根気よく続けることが効果的です。

駆除する理由

繁殖力が強いので、日本に昔からある植物を駆逐してしまいます。

カワラナデシコ



カワラサイコ

